

Mémoire

Sur la structure de la matrice, et son développement pendant
la grossesse.

L'adhérence naturelle du placenta à la matrice;

L'origine des vraies et fausses eaux, et le siège principal de ces
dernières.

La manière dont se fait la circulation de la mère à l'enfant
et vice versa!

De la matrice, l'adhérence contre nature du placenta
et de la formation des différentes espèces de faux germes.

La question, sur la nature, la structure de la fibre utérine,
son développement pendant la grossesse, de même que sur la manière
dont les vus nourriciers son portés au fœtus, étant encore au nombre
de celles qui n'ont pas été suffisamment éclaircies par les anatomistes,
je vais faire ensuite de les exposer telles que la nature me la fait
connoître plusieurs fois dans l'intention de fixer à l'avenir la décision
des physiologistes à cet égard;

1^o. Sans m'arrêter à faire une description circonstanciée des
dimensions extérieures de la matrice et de la division des différentes
parties qui la composent, je me bornerai à faire remarquer seulement
que la cavité de la matrice dans l'état ordinaire de vacuité, n'est pas
arrondie, mais aplatie; que la partie moyenne de son fond, et celle
de son corps, tant dans la partie antérieure que dans l'extérieure et externe,
ont au moins dans le centre de leur convexité, le double d'épaisseur,
que dans les bords latéraux; disposition sans doute, qui entre dans
les vues de la nature pour en favoriser le développement dans la
grossesse.

2^o que pour expliquer la nature de ce développement, les physiologis-
tes ont eu recours à des hypothèses, par ce que les anatomistes ont ignorés

La nature de la fibre qui entre dans la composition de la matrice, de même que la disposition ou l'arrangement particulier de ces mêmes fibres; car ils ont avancés qu'elles étoient charnues, disposées longitudinalement obliquement et circulairement; ou repliées sur elles mêmes, ou en spirales, pour faciliter la distension ou le rapprochement de la cavité, comme dans les autres viscères du bas ventre. mais on n'en peut pas dire de même de la matrice dont la petite capacité, hors l'état de maladie ou de grossesse, reste à peu près dans la même dimension; tandis que les fibres qui entrent dans la composition de ses parois, ne sont pas dans le cas de se déployer, — à moins qu'elles n'y soient forcées par la formation d'un corps étranger qui se développe dans la cavité, ce qui ne se fait alors qu'imperceptiblement, tandis qu'aux autres viscères dont je viens de parler, la dilatation s'en fait quelque fois d'une manière assez rapide, pour revenir bientôt après à leur volume ordinaire.

3^o: pendant les différens degrés d'extension et de rétrécissement alternatifs de ces viscères, leurs fibres musculaires s'allongent et se contractent de manière qu'elles deviennent plus grêles dans le premier cas, et plus épaisses dans le second; et si cet allongement de la fibre motrice est porté trop loin, elle s'affaiblit de plus en plus et perd enfin son ressort, de manière qu'au bout de 24 heures il peut en arriver des accidens mortels par la rétention de l'urine accumulée dans la vessie, dont les fibres contractiles forcées dans leur extension, n'ont pas le temps de remettre à leur longueur naturelle: tandis que celles de la matrice ne se développent que par degrés insensibles pendant neuf mois, au bout des quels elle ne laisse pas que de se contracter avec une vigueur étonnante lors que le moment du travail est arrivé.

article premier.

exposition de la nature de la fibre de la matrice.

Les accoucheurs ont toujours été étonnés que des fibres charnues, distribuées dans une épaisseur aussi mince que celle qui fait partie des parois de la matrice, et qui sont tout au plus de deux lignes, lors du travail de l'enfantement, eussent un degré de contraction aussi puissant que celui qui se manifeste alors, comparé à celui qui existe dans d'autres muscles d'une épaisseur à peu près égale, et dont l'effet cependant n'est pas aussi considérable; ce qui a dû laisser par conséquent des doutes sur la nature de la fibre utérine qui jouit d'un tel degré d'élasticité.

en effet : la fibre utérine est douée d'une texture plus solide que celle que l'on remarque à la fibre charnue proprement dite : et si celles qui sont d'une texture plus solide sont susceptibles de raccourcissement après avoir été distendues, il n'en suivra que celles de la matrice en seront également susceptibles.

La matrice ne peut être comparée à un muscle creux, comme p. ex. le cœur, l'estomac, la vessie, &c. qui sont destinés par la nature à se mouvoir, se dilater, se contracter, se remplir et se désempir continuellement pour exécuter leurs différentes fonctions ; celle de la matrice étant d'un tout autre genre, n'est point susceptible d'aucun de ces mouvements, si ce n'est dans des circonstances particulières qui ont rapport à la grossesse ; la femme au surplus pouvant passer toute sa vie, sans être assujettie à cette fonction, que l'on pourroit appeler momentanée, relativement à la pérennité des autres.

Cela étant, la matrice hors de la grossesse et pendant cet état même, pourroit n'être considérée que comme une glande d'une espèce particulière destinée à séparer de la masse du sang, des humeurs propres à la formation l'accroissement et à la nourriture du fœtus étant composée comme les autres glandes, de cavités, de réservoirs, de vaisseaux sécrétoires et excrétoires, tant sanguins que lymphatiques, absorbans et nerveux, mais qui ne doit remplir ses fonctions principales, qu'à une certaine époque de la vie, également que plusieurs autres glandes, telles que les mammaires et autres.

On ne doit donc regarder la matrice, dans le cas qui nous occupe en ce moment, que comme un tissu particulier de fibres très élastiques, qui ne se raccourcissent ou ne reviennent sur elles même, qu'autant qu'elles ont été éloignées par la cause distensive : à la différence des autres muscles, qui quoique dans un état de relâchement, ne laissent pas que de se contracter ou de raccourcir par le ^{rapproch}ement de leur extrémité : je m'explique et je dis que les anatomistes regardent le tendon qui termine l'extrémité d'un muscle, comme incapable de relâchement et de contraction : c'est à dire que dans l'état naturel sa solidité l'empêche de se contracter et de se relâcher alternativement comme le fait la fibre charnue pour l'exécution des mouvements naturels ; mais qu'il ne s'en suit pas que le tendon ne puisse être allongé à un certain point par une cause supérieure à sa résistance, et que cette puissance venant à cesser, le tendon ne récupérera pas quelque temps après, sa longueur ordinaire ; cette propriété est appelée élasticité, et c'est cette vertu élastique, bien moindre dans la fibre charnue, que possède dans un degré éminent, la fibre de la matrice.



mais cette qualité seule ne suffiroit pas pour en operer si éminemment la contraction dans le travail de l'enfantement, dans un ordre différent de fibres que celui que luy ont supposé les anatomistes; en effet la rectitude prétendue des fibres ^{charnues de la matrice} uterines, de même que leur plissement, ou leur direction spirale pourroit en favoriser la distension en procurant l'atonie de la fibre, et l'éminissement de ses parois, tandis qu'au contraire, elles conservent, à peu de chose près, le même degré d'épaisseur, de solidité et d'élasticité dont elles jouissoient au paravant. ce qui seroit difficile d'expliquer et de concevoir, en s'en tenant au sentiment de ceux qui luy ont supposé une pareille direction et une pareille nature.

Commençons donc par découvrir la nature de la fibre contractile de la matrice, de même que l'ordre de sa distribution dans la substance de ce viscère.

1.

Si l'on fait une section verticale à la paroi d'une matrice extraite du corps de la femme après l'accouchement, et qu'on ait laissé dégorger les gros vaisseaux du sang qu'ils pouvoient contenir; on observera que la substance en est blanche et solide; le contraire se remarque dans la section d'un muscle de pareille, ou moindre épaisseur;

2.

Si l'on porte la pointe du scalpel horizontalement sur la surface externe de la matrice, après avoir enlevé une partie du péritoine qui luy sert d'enveloppe, et qui y est fortement adhérent; on découvre alors les fibres uterines entrelacées de vaisseaux; elles sont blanches, très fines, et solides, de manière qu'elles forment de la résistance au tranchant de la lancette qui en fait la dissection; tandis que la mollesse de la fibre charnue, se laisse diviser par la pointe de cet instrument, avec bien plus de facilité.

3.

J'ay mis dans un pot de terre, la matrice d'une femme morte cinq jours après un accouchement très laborieux, et dont le tissu étoit encore molasse; je l'ay bien environnée de calpêtre, pour savoir si les fibres uterines rougiroient, et ne démontreroient pas par cette épreuve indiquée par quelqu'un, leur nature charnue; au bout de trois semaines que je l'en retrai, je n'observai aucune rougeur aux fibres de cette matrice; alors même cette couleur seroit étrangère, et ne pourroit exister que dans celle dont les vaisseaux seroient encore gorgés de sang.

4.

Il suit de ces diverses expériences, que la solidité jointe à la

Blancheur de la fibre ~~utérine~~, ne sont point de la nature de la fibres charnues, et que si elle beaucoup d'élasticité, elle ne la possède qu'en vertu de sa nature tendineuse.

Lors qu'on examine la parois d'une matrice divisée selon son épaisseur dans une femme morte huit jours même après son accouchement, on y observe effectivement des traces ondulées très sensibles, qui feroient croire au premier coup d'oeil, que des fibres après avoir été distendues par la grossesse, se sont repliées sur elles même après la contraction qui s'en est suivie, comme font les côtes d'aventail, ou les bandes d'une persienne, mais ces replis ne sont formés que par l'entrelacement des mailles de la matrice, tels qu'on les apperçoit au revers d'un bas.

De toutes les matrices que j'ay eu occasion de disséquer immédiatement après la sortie de l'enfant, ou sept ou huit jours après l'accouchement, j'ay constamment observé, (et chacun en pourra faire de même en y prenant de la manière que je viens d'indiquer page 4. 5. 2.) que le tissu principal de la matrice est composé de mailles, ou d'espèces de cerceaux, formés chacun de cinq à six filets blancs, d'une nature tendineuse, et de la grosseur d'un cheveu, situés parallèlement à côté les uns des autres, très sensibles à l'oeil nu, et qui forment des entrelacements pareils à ceux que l'on voit aux brassolats de crin; et c'est dans l'interstice de ces mailles, situés à côté et au dessous les uns des autres, que serpentent les vaisseaux sanguins de la matrice qui se détournant successivement d'une maille à l'autre, deviennent par là extrêmement tortueux, et ralentissent par ce moyen, considérablement la circulation qui se fait dans cet organe; tandis que l'expansion des mailles utérines devenant plus considérable à mesure que des parois se développent, les vaisseaux ont la liberté d'augmenter de calibre, au point de surpasser en plusieurs endroits, le volume d'une plume d'oie, particulièrement dans les côtes et à la partie inférieure et antérieure de la matrice, immédiatement au niveau de son orifice interne, où j'ay remarqué un tronc principal si volumineux qu'il auroit admis un algali du plus gros calibre, et dont les rameaux se portent dans l'épaisseur de la parois inférieure et antérieure de la matrice, ce qui paroît démontrer le danger qu'il y auroit, de pratiquer la section caesarienne sur la partie inférieure de la ligne blanche, et ce n'est réellement que par l'écartement qui survient aux mailles de la matrice, que se fait l'expansion prodigieuse des parois de ce viscère, sans que pour cela elles perdent de leur épaisseur; ces premiers phénomènes étant ainsi expliqués, passons à présent à d'autres qui ne sont pas de moindre considération.



7.

La partie moyenne du fond, et celle de la paroi tant antérieure que postérieure de la matrice, étant plus convexes et éminentes que partout ailleurs, ont aussi beaucoup plus d'épaisseur, et doivent être regardés comme autant de centres particuliers, d'où partent les couches de mailles entassées qui se rependent dans la substance propre à en opérer la dilatation; car c'est là où elles sont réellement en réserve pour fournir à l'expansion de la matrice par leur développement successifs, à peu près comme on peut le remarquer dans la structure d'une bourse ou à l'extrémité d'un pied de bas: dans cette première, le centre, ou le point fixe de la première maille, commence la bourse; dans le second au contraire, c'est c'est la dernière maille qui le termine; dans la bourse, les mailles qui suivent la première, se trouvent disposées orbiculairement pour s'éloigner du centre; dans le bas, c'est le contraire et elles produisent également le même mécanisme: c'est dans ces trois endroits qu'elles se trouvent entassées par couches orbiculaires surajoutées les unes aux autres, dont les extérieures ont moins d'étendue pour se développer proportionnellement au degré d'expansion nécessaire à la matrice, et dans le rapprochement desquelles, s'opère également la contraction, qui devient d'autant plus forte, que ces mailles se sont rapprochées sur elles même par le vuide qui s'est opéré dans le viscère par l'expulsion d'une partie du corps ovoïde, qui remplissoit auparavant toute la capacité.

E.

Si des fibres utérines étoient autrement disposées suivant le sentiment commun des physiologistes, il en résulteroit nécessairement que la cavité de l'utérus, débarrassée totalement des corps qu'elle contenoit auparavant, se trouveroit arrondie, tandis qu'elle s'applatit intérieurement comme une gibbete, telle qu'elle étoit avant la dilatation; et reprend insensiblement le même degré d'épaisseur dans les trois endroits désignés cy dessus, de sorte que Méhersch, n'a pas eu tort d'avancer, (comme le plus grand nombre des anatomistes le prétendent cependant) que la face interne du fond de la matrice, étoit disposée en petits cercles; et que de leur réunion, il en résulteroit un muscle orbiculaire qui servoit à en contracter le fond, pour en expulser le placenta. J'ajouterai même, que si l'on eut porté des recherches avec la même attention tant du côté antérieur que du côté postérieur de cet organe,

7
Il y auroit rencontré également le même mécanisme, et qu'il y auroit démontré trois muscles au lieu d'un. Si l'on veut appeler ainsi cet ordre de fibres, qui servent puissamment à l'expulsion du fœtus lors du travail de l'accouchement.

9
Les fibres de la vessie distendues par la quantité d'urine plus ou moins considérable qu'elle contient, raient ordinairement sur elle-même après l'expulsion qui en a été faite sans qu'on apperçût presque de changement dans l'épaisseur de ses parois: tandis que celles de la matrice qui étoit de deux lignes au plus au moment du travail, acquiert bientôt après l'expulsion du fœtus, celle de cinq à six, ensuite celle de douze à quinze lignes, dans les trois endroits désignés cy dessus, huit jours après l'accouchement; les physiologistes prétendent encore donner raison de cette différence en disant que ce sont les vaisseaux et les sinus utérins gorgés de sang, qui déterminent alors cette épaisseur extraordinaire, tandis que cette dernière cause n'y entre presque pour rien.

10
Lors qu'on dissèque une matrice quelque temps après l'expulsion du fœtus, ou sept à huit jours après l'accouchement, temps auquel le centre des parois a acquis l'épaisseur de douze à quinze lignes, et qu'elle ne conserve plus que la grosseur du poing, on ne découvre pas d'engorgement dans les vaisseaux, cependant les parois ont beaucoup de blancheur et de solidité: le phénomène dépend de la structure des mailles de la matrice, comparées au tissu d'un drapillet de crin qui forme des cerceaux qui s'allongent en se rétrécissant pendant l'introduction du poing et qui se relargissent ensuite en se recouvrant autour du poignet; et est incontestable. D'après mes observations, que le tissu principal de la matrice étant ainsi composé d'un million de cerceaux très élastiques, entrelacés les uns dans les autres, que ces cerceaux dis-je, sont supposés être couchés de champ à côté les uns des autres dans l'épaisseur de la matrice, et que si dans cet état, ces cerceaux sont forcés à s'élargir par l'augmentation du calibre que subissent les vaisseaux utérins pendant les commencemens de la grossesse, (ce qui augmente alors l'épaisseur de ses parois) ces mêmes cerceaux sont contraints de se redresser par la suite en s'allongeant, conjointement avec les vaisseaux qu'ils entrelacent, par l'extension progressive de la matrice; ce qui est la cause pour laquelle elle n'augmente pas d'épaisseur dans les derniers temps de la grossesse: tandis que pendant le travail de l'accouchement, ces mailles, comme autant de petits muscles particuliers, tendent fortement à se contracter et à revenir sur elles-mêmes; Souvenant déjà, pendant que le travail avance, une augmentation graduelle d'épaisseur, au fond et au corps de la matrice, jusqu'à ce qu'étant une fois débarrassée de tous les corps étrangers qu'elle contenoit, elle se resserre avec plus de liberté, et revient plus puissamment sur elle-même; c'est alors que ces mailles considérablement élargies par leur distraction précédente de même que par les ramifications nombreuses et multipliées des vaisseaux volumineux qui sont entrelacés dans leur texture, se trouvent replacés de champ, comme ils l'étoient avant la distension de la matrice; ce qui augmente pour lors considérablement son épaisseur qui diminue par la suite



de jour en jour, par le raccourcissement des cerceaux, autour des Arus et des vaisseaux
ce qui en retreint insensiblement le calibre, au point de le réduire à l'état naturel, et
de disparaître pour la plus part tout à fait, de même que ces cerceaux qui ne peuvent
être visibles que dans l'état de grossesse avancée.

11

La Centre de la parois postérieure et extérieure de la matrice étant plus convexe et plus
épais que partout ailleurs; c'est la aussi où il y a un plus grand nombre de mailles
entassées pour fournir à son expansion, comme on le remarque particulièrement
à la femme morte dans un état très avancé: la parois antérieure est plus
aplatie naturellement et aussi par la résistance que lui opposent les muscles abdo-
minaux, qui la soutiennent dans son obliquité en devant, tandis que la parois posté-
rieure, libre de toute résistance un peu considérable, s'expand davantage en
s'arrondissant, pour augmenter l'espace dont le viscère a besoin.

12

Il suit de cette démonstration, que lors que la contraction de la matrice s'exerce
pour l'expulsion des corps contenus dans sa cavité, ce n'est pas dans le fond seul
que réside la principale puissance propre à produire cet effet; mais qu'elle réside
également tant dans la partie antérieure que postérieure; et que c'est au moyen
de la réunion de ces trois puissances, que le corps ovoïde contenu dans sa
cavité, peut être dirigé plus convenablement à son expulsion selon l'axe
longitudinal de la matrice; en effet les accoucheurs attentifs ne remarquent
ils pas, que lors que la contraction simultanée du fond et de la parois tant
antérieure que postérieure, agit sur le corps ovoïde qu'elle contient; l'expulsion,
toute chose égale d'ailleurs, s'en fait plus uniment, plus fortement et plus
promptement: tandis que l'une des trois puissances étant en défaut, particulièrement
à la partie antérieure ou postérieure, soit par l'implantation du placenta, ou
toute autre disposition capable d'affaiblir le ressort local d'une de ces parties,
la direction des forces utérines est alors changée, et que le corps qui devoit
naturellement tendre à porter à plomb sur l'orifice, par le concours simultané
des trois puissances réunies, ne le faisant pas, le déjetent, soit du côté
antérieur ou postérieur de la matrice, et occasionne ces douleurs dans les
lombes ou vers le nombril que l'on remarque assez souvent, et qui sont plus fati-
guantes pour la femme en travail, que si elles tendoient plus directement vers
le bas: et que c'est pour cette raison encore, que l'adhérence naturelle du
placenta sur les parties latérales de la matrice, étendant par sa position, une
partie de la puissance contractile de ce viscère, est plus lente à détruire.

13

L'architecture du col de la matrice ne m'a pas paru être la même que celle du
fond et du corps de cet organe: et les différens replis valvulaires qui se remarquent
dans sa face interne, semblent le dénoter. D'ailleurs il en est séparé par une
ligne de démarcation qu'on apperceoit extérieurement au niveau de son
orifice interne, ou suivant toute apparence le bord des plans orbitaires


2
dont j'ay parlé, se terminent.; c'est ce qui fait que lors que le museau de
tanche a été confondu a son tour dans la cavité de la matrice pour former le
segment inférieur du globe utérin, les parois en restent plus amincies, et moins élastiques,
a près l'accouchement, qu'ils ne le sont dans le reste des parois de ce viscère.

14.

Le produit d'une bonne Conception contenu dans la matrice, la remplissant
exactement de toute part, en croissant continuellement fait l'effet d'un levier appuyé
contre tous les points de la cavité sans exception, qu'il tend a écarter uniformément
a la fois, de maniere que le fond de cet organe ne s'étend pas plus a proportion que
les autres parties, et si le segment inférieur de la matrice a paru céder a cette
extension ^{moins} que les autres; c'est parce que le museau de tanche qui y est suspendu
par sa base, en masque la paieur de même que le progrès de sa distension —
qui ne devient sensible que vers le quatrième mois de la grossesse, tems ou l'on
remarque le même museau se gonfler et se raccourcir, par ce que sa base
implantée sous les dernières fibres de la partie inférieure du corps de la matrice,
commence a s'élargir, entraînée qu'elle est par la distension des mailles —
qu'elle éprouve sensiblement cette partie, il en résulte que le fond du vagin dont
les fibres charnues vont se confondre dans le contour extérieur du col, acquiert
aussy plus d'évasion, etant entraînées par celle que vient de subir ce dernier,
d'où il en résulte le raccourcissement progressif du museau a sa base, jusqu'a
ce qu'enfin, l'amplitude du vagin, entraîné par l'accroissement sphérique
de la partie du segment inférieur du globe utérin, ressemble au pavillon d'un
entonnoir propre a admettre la tête du fœtus; c'est alors que le col de la
matrice est totalement effacé, et que l'on ne rencontre immédiatement du
bout du doigt, que l'orifice externe plus ou moins entreouvert: et il reste
encore quelque vestige du canal qui formoit auparavant le col de la matrice,
c'est parce que le tissu cellulaire dont il est composé, se trouve plus ou moins
infiltré ou gorgé, et qu'en cet état il est plus dur, que celui qui répond
a la cavité, et dont le bord est plus tranchant.

15

La matrice, parvenue une fois a ce dernier degré de développement,
va nous dévoiler les phénomènes que nous allons examiner dans sa
face interne.



1. Die erste Aufgabe ist die, die
 2. Die zweite Aufgabe ist die, die
 3. Die dritte Aufgabe ist die, die
 4. Die vierte Aufgabe ist die, die
 5. Die fünfte Aufgabe ist die, die
 6. Die sechste Aufgabe ist die, die
 7. Die siebte Aufgabe ist die, die
 8. Die achte Aufgabe ist die, die
 9. Die neunte Aufgabe ist die, die
 10. Die zehnte Aufgabe ist die, die

1. The first part of the book is a history of the
 2. second part is a description of the
 3. third part is a description of the
 4. fourth part is a description of the
 5. fifth part is a description of the
 6. sixth part is a description of the
 7. seventh part is a description of the
 8. eighth part is a description of the
 9. ninth part is a description of the
 10. tenth part is a description of the

1. The first part of the paper is devoted to a general
 introduction to the subject of the paper, and to a
 brief review of the literature on the subject.
 2. The second part of the paper is devoted to a
 detailed description of the experimental apparatus
 and the experimental procedure.
 3. The third part of the paper is devoted to a
 discussion of the results of the experiment, and to
 a comparison of the results with the theoretical
 predictions.
 4. The fourth part of the paper is devoted to a
 summary of the results of the experiment, and to
 a conclusion.

[Faint, illegible handwriting]

Dec 11th 1891
 Dec 12th 1891
 Dec 13th 1891
 Dec 14th 1891

Concernant la structure intérieure de la matrice, ou l'on découvre l'adhérence particulière du placenta au moyen de laquelle le fœtus tire sa nourriture par des appendices Coecales ou veineuses utérines, et des vaisseaux lymphatiques qui sont la source des eaux de l'amnios.

La matrice distendue autant qu'elle peut l'être sur la fin de la grossesse, — commence à éprouver des petites contractions de la part des cercles utérins qui entrent par tout dans sa composition; et de ces petits efforts, il en résulte successivement de plus considérables qui vont en augmentant pour favoriser l'expulsion du corps ovoidé qui s'y trouve renfermé, et qui y adhère par un mécanisme particulier qui n'a pas encore été bien développé, et que je vais tâcher de démontrer.

1
Il est connu aujourd'hui de tout le monde, que la face concave du placenta qui tient à la matrice, est partagée par des sillons plus ou moins profonds, en plusieurs portions plus ou moins éminentes que l'on appelle lobes, qui sont relus dans de pareils enfoncements imprimés dans la partie spongieuse de la matrice, de même qu'un cachet sur de la cire; mécanisme qui paroit encore à plusieurs accoucheurs, le seul moyen d'adhérence établi entre les deux parties, pour transmettre de la mère au fœtus, par une prétendue absorption de la part du placenta, les vus lacteux propre à son accroissement.

2
Si c'étoit là le seul moyen d'union que la nature eut établi entre ces deux parties, ne seroit-il pas trop faible pour résister aux efforts et aux mouvemens violens que de donnent trop souvent la mère et le fœtus, et n'en résulteroit-il pas des pertes de sang beaucoup plus fréquentes, par le décollement facile, auquel ces parties se trouveroient par la plus exposées :

3
mais le placenta est encore fortifié dans son union avec la matrice, au moyen des appendices Coecales ou veineuses, et de vaisseaux lymphatiques qui partant de celle cy, s'insèrent plus ou moins profondément dans celui là, et le traversent même entièrement, comme je le démontrerai Bientôt par mes observations.

4
Ces appendices sont telles que Mr. Astruc les a fait dessiner dans les 2^{es}, 3^{es} et 4^{es} planches qu'il a mis à la tête de son traité des maladies des femmes, et aux quelles, bien peu d'anatomistes ont ajoutés foy; mais il place l'origine de ces appendices Coecales, au confluent de deux veines ou artères utérines, tandis qu'elles ne sont que le prolongement de la membrane interne des Arus utérins même, dont il paroît qu'il ignoroit alors — l'existence, tandis qu'aujourd'hui, il ny a rien de mieux démontré.



5. 5. a l'égard des faisceaux lymphatiques, qui traversent entièrement la substance du placenta pour aboutir jusqu'à l'amnios, je pense que cette découverte m'est particulière, et alors il ne doit plus à l'anomir y avoir de doute sur la manière dont le sang de la mère passe au fœtus, et sur l'origine des vaisseaux lymphatiques utérins qui transmettent la liqueur de l'amnios, dans laquelle il nage dès le moment qu'il est parvenu dans la matrice, jusqu'au temps de la sortie.

manière de procéder à la vérification des faits énoncés cy dessus.

première observation anatomique.

Désirant vérifier l'exposé de Mr. Astruc touchant les appendices veineux, la première femme que j'eus occasion d'avoir étoit morte six jours après son accouchement des suites d'une perte de sang. j'emportai la matrice chez moy et après l'ouverture que j'en fis, je ne trouvai au fond de cet organe, que trois gros filaments, comme l'extrémité d'une petite ficelle, de trois à quatre lignes de longueur dont l'un étoit contourné en spirale; je ne tirai l'autre satisfaction de cette recherche, que celle d'appercvoir qu'en effet, il ne prolongeoit quelque chose de la matrice, pour s'insinuer dans le placenta, mais sans s'en avoir leque c'étoit.

2^e. j'appris qu'une jeune femme venoit de mourir presque subitement après avoir été de l'urde; j'en obtins l'ouverture: après avoir incisé la matrice qui étoit remplie de caillots, j'en retirai la plus grande partie, et après l'avoir détaché du cadavre, je l'emportai pour en faire l'examen: je m'avais de la mettre dans une certaine quantité d'eau sur le feu, et je la fis bouillir pendant un quart d'heure en suite de quoy je l'en retirai pour la laisser se refroidir.

observation intéressante 3^e. cela fait, je détachai avec précaution le caillot qui étoit resté au fond de la matrice, on s'appercut une rangée symétrique de faisceaux fibreux, en forme de petits fuseaux de poils d'écureuil aplatis, placés sur plusieurs lignes, parallèlement à côté les uns des autres, dans toute l'étendue auparavant occupée par le placenta qui avoit été extrait sans doute, avec trop de précipitation; je les voulus successivement avec le bout d'un stile, et j'appercus contre leurs racines, plusieurs petits grumeaux de sang caillé, dont les uns n'étoient pas plus gros que des lentilles, d'autres comme des petits pois, d'autres enfin faisant deux ou trois contours en spirale, de la longueur de deux à trois lignes, et de la circonférence d'un tuyau de plume d'aile de poule. ce qui me fut connoître incontestablement les appendices veineuses utérines qui n'étoient retirées du placenta dans laquelle elles étoient plongées auparavant, et dont une partie du sang qu'elles contenoient encore, n'étoit durci par l'ébullition que j'avois fait subir à la matrice.

4^o Comme une seule remarque ne suffit pas toujours pour constater une découverte, malgré que j'étois bien convaincu de la réalité de celle-ci, je résolus des lors de ne laisser échapper aucune occasion de la vérifier par la dissection afin de lui donner toute l'assurance dont elle pourroit être susceptible: mais comme il ne nous est pas toujours possible d'en profiter lors qu'elles se présentent, que d'ailleurs elles sont assez rares, j'ay été depuis, un grand nombre d'années, avant que j'eusse l'occasion favorable de donner suite à mes recherches, en attendant, j'ay eu assez souvent celle de faire la remarque suivante, à laquelle cependant peu d'accoucheurs ont fait attention: c'est que huit ou dix jours après l'accouchement, et que la femme a été délivrée naturellement et sans efforts, on trouve toujours à l'endroit où le placenta étoit implanté à la matrice, un grand nombre de filamens ramassés en faisceaux plus ou moins volumineux, dont la plus part ont jusqu'à un pouce de longueur, et dont on ne démontre pas l'utilité et l'usage que je me propose aussi de développer.

Ces filamens sont renfermés dans un tissu cellulaire assez souvent graisseux et rougeâtre: ils paroissent être désignés dans la table V. à la lettre b. b; ou Burton expose une matrice retournée, à la face interne de laquelle on observe un grand nombre de filamens beaucoup plus courts qu'ils ne le sont ordinairement, et qu'il paroît confondre avec le muscle orbiculaire de Puiseh, qu'il prétend représenter; et j'avois toujours soupçonné que ces filamens n'étoient que des vaisseaux lymphatiques qui plongeoient plus profondément dans les cellules du placenta, que ne le faisoient les appendices utérins veineux, qui suivant leur dénomination, ne devoient contenir qu'un sang veinal — d'après ce que des nourriciers, mais propre seulement à renouveler la veine ombilicale de la quantité de celui qui pouvoit rester dans le corps du fœtus, tandis que leur contraire, transmettoient dans les vaisseaux du placenta, les lymphaux propres à réparer ceux que la veine ombilicale déposoit continuellement dans le fœtus pour son accroissement: malgré le peu de justesse de l'opinion que j'en concevois alors, nous verrons par la suite, qu'elle n'étoit pas aussi éloignée de la vraisemblance, que l'on pourroit se l'imaginer.

autre remarque sur
la matrice.

5^o mais avant d'en venir là, j'ay une autre remarque à faire, que j'en dois pas passer sous silence, à l'occasion de cette matrice que j'ay dit, page 4. de ce mémoire S. 3. avoir plongé dans du salpêtre cinq jours après la mort du fœtus dont j'étois tiré; elle étoit molle et fort oblongue, de sorte que l'intervalle qui se rencontroit entre l'insertion des trompes et son orifice avoit le double d'étendue au dela de celle qu'on remarquoit à son fond; les faisceaux lymphatiques paroissoient presque entièrement détruits soit par suppuration ou gangrene, ce qui mettoit totalement à découvert plusieurs orifices des veines utérines dépourvus de leurs —

(a) Mr. Astruc les a
ainsy nommés, dit par
ce qu'on ne leur remarque
qu'une embouchure, dit
par ce qu'on les observe
souvent contournées
en spirales comme
l'appendice du Coecum.
alors elles ne prennent
ce contour, que parce que
quelques fibres se détachant
des mailles intérieures
de la matrice pendant
le prolongement des
appendices, celles entourent
quelque fois, elles les
maintiennent dans cette
inflexion spirale,
comme j'ay eu occasion
de le remarquer.

appendices veineuses ou Coecales (a) j'en observai un dont l'entrée pouvoit
admettre très aisément l'extrémité d'une plume de cygne. Son rebord étoit
d'une nature tendineuse par sa solidité et sa blancheur. mais ce qui me
flatta davantage, c'est que le rebord tendineux paroissoit ainsy maintenu
dans ce calybre, par trois cerceaux filamenteux, qui péroient d'autre
en outre le bord de cet orifice, de maniere à le diviser en trois portions,
pour de la se renverser au dehors, et de se confondre comme dans un point
de résistance, avec les autres mailles que j'ay vu composer principalement
le tissu de la matrice.

B. Il est tems à présent d'en venir aux preuves que j'ay avancées touchant
l'exposition des appendices veineuses, dont la fonction n'est pas telle que
leur nom paroît l'indiquer. puisqu'elles prennent leur origine de l'ouverture
extérieure des sinus uterins dont elles sont la prolongation, et qu'elles
ne sont remplies que d'un sang artériel, et par conséquent nutritif, qu'elles
transmettent directement dans les cellules du placenta, et de la dans
les ramifications de la veine ombilicales; tandis que les vaisseaux lymphati-
ques que l'on apperceoit sortir de toute la face interne de la matrice
traversent le chorion et l'amnios, de même que toute l'épaisseur du
placenta, pour dégorger dans la cavité que forme cette dernière
membrane, la liqueur abondante dans laquelle le fœtus nage
pendant tout le tems qu'il est renfermé dans le sein de sa mère.

article troisieme

qui renferme les preuves de l'existence des vaisseaux lymphatiques
ou lacteux de la matrice, de même que celle des appendices
Coecales ou veineuses.

Seconde observation anatomique.

Il y a près de quinze ans, que sur la fin de l'hiver, la femme d'un
garçon menuisier, mère de plusieurs enfans mourut dans mon voisinage
ensuite d'une fluxion de poitrine: elle étoit près de son terme, et je m'y
transportai au moment qu'elle venoit d'expirer: je luy fis l'ouverture des
muscles abdominaux et de la matrice, le long de la ligne blanche pour
en retirer l'enfant qui ne donna aucun signe de vie, la matrice ne me
parut avoir que deux lignes d'épaisseur: j'observai que les membranes
tapissoient l'orifice de la matrice dilaté au moins de la largeur d'un
œuf de pigeon.

Je laissai les choses dans leur situation naturelle après en avoir débarrassé
l'enfant par la section du cordon ombilical, pour y retourner le
lendemain vers les neuf heures du matin sous prétexte de l'ensevelir
dans le sein de sa mère; je détachai alors la matrice du cadavre, et

et je n'en entrepris la dissection que le lendemain après midi: pendant cet intervalle, les vaisseaux eurent tout le tems nécessaire pour se dégorger du sang qu'ils pouvoient contenir, et ne pas m'empêcher par sa présence de reconnoître les choses dans leur état naturel.

10. après avoir procédé à l'examen des mailles ténues qui font la principale texture de la matrice, et dont j'ay fait la description page 5. de ce mémoire, je passai à celui de la face interne: le placenta étoit adhérent vers son fond, ne portant néanmoins vers la partie antérieure de la matrice, de sorte qu'il fut dirigé d'environ deux pouces à son bord antérieur, par la section faite pour extraire le fœtus: je procédai à son détachement avec douceur et attention: j'appris qu'en le faisant, quantité de filasseaux filamenteux dont les filats étoient unis par un tissu cellulaire un peu gras, de même qu'on l'observe aux fibres de chair brouillées après distans les uns des autres, qui communiquoient de la matrice au placenta: les filamens pretoient la plus part, de la longueur de près d'un pouce au degrés d'extension produite par la dévulsion graduée du placenta, avant de quitter leur insertion, de manière qu'il en restoit très peu, qui n'avoient pu se retirer du placenta, que parce qu'ils n'étoient rompus du côté de la matrice; tandis que le plus grand nombre se retiroient dans la face interne de celle cy en abandonnant facilement le placenta: pendant ce tems, j'observois aussi la formation des lobes qui se développoient à sa surface, de même que les appendices veineux, dont la parois étoit transparente, de calibre d'une petite plume à écrire et de la longueur de deux à trois lignes, légèrement teintes intérieurement de viscosité sanguinolente, de la même couleur qu'on l'apperoit à travers le tube d'un thermomètre à l'esprit de vin qui s'est décoloré, dès qu'il paroisoient au moment qu'elles abandonnoient les cellules du placenta, en s'affaissant et en se contractant (vers l'embouchure du sinus utérin: dont la membrane interne, formée seule par son prolongement, la parois transparente de l'appendice locale, qui s'insinua en manière de mamelon dans la substance du placenta à travers les embouchures assez remarquables et isolées qu'on observe sur la surface externe de la membrane qui le recouvre et de laquelle à la moindre pression, on voit dégorger une viscosité sanguinolente.

20. Les sinus utérins ne peuvent être considérés que comme des réservoirs d'une capacité assez considérable, dans lesquels plusieurs rameaux artériels courent pour y déposer le sang qui doit être transmis au fœtus, de manière que pendant que la plus grande partie s'écoule dans le corps de la mère, au moyen d'un nombre à peu près équivalent de branches veineuses qui le reportent dans le torrent de la circulation, tandis que la plus petite partie est exprimée par la matrice au moyen des appendices utérines, dans les



Dans les cœlites du placenta, ou il est pour ainsi dire en stagnation, jusqu'à ce que les racines des veines ombilicales, y pompent au besoin, le sang ainsi chargé de principes spirituels et nutritifs, propre à renouveler le développement qui s'en fait dans le corps de l'enfant: et il est plus que vraisemblable, que c'est uniquement de cette manière que le sang de la mère, passe au fœtus.

Je me parvins après cela, à la cœte de la surface interne de la matrice; en en détachant doucement le chorion: et j'observai aussi qu'il partoit de tous les points de cette circonférence, de turgescences blanchâtres qui s'allongeoient de plus d'une ligne, par la division graduée que je faisois du chorion: et qu'au point que ces turgescences l'avoient abandonné, ils se retireroient contre la parois interne de la matrice pour disparaître entièrement: tandis que les extrémités artérielles ombilicales, qui tapissent en forme de duvet la surface hérissée du chorion, en faisoient autant de leur côté: d'où venoit que cet entrelacement de vaisseaux différens, est formé dans le premier cas, par les vaisseaux lymphatiques, qui dégorgent en traversant les membranes, cette grande quantité de liqueur dont l'amnios est plus ou moins remplie; tandis que dans le second, ce sont les extrémités capillaires ombilicales qui transmettent dans les veines utérines, le superflu du sang qui a été dépouillé dans le corps de l'enfant pour le renouveler dans celui de la mère: et ce n'est que par les deux moyens que je viens de découvrir, que se fait la circulation de la mère au fœtus, et vice versa. ce qui est cependant contre l'opinion adoptée par les modernes.

première observation
Sur les fausses eaux

40. La source des vraies et des fausses eaux, ne peut mieux être constatée qu'elle l'est à présent par mes découvertes comme on le verra par la suite, qui prouvent également que le siège de ces dernières existe pour ainsi dire toujours entre le chorion et la matrice, parce que les canaux lymphatiques, délogés par une cause quelconque des membranes, qu'ils traversoient auparavant, (v.g. en suite d'une impulsion subite faite contre un point donné de la matrice ou ils se détachent) s'étant retirés au niveau de la face interne, dégorgent alors entre elle et le chorion détaché, cette liqueur s'écoule et se transmise dans l'amnios, et elle s'y accumule insensiblement, jusqu'à ce que par sa quantité et sa pesanteur, elle soit venue à bout de détacher le chorion de la matrice. Dans tout le trajet nécessaire pour parvenir à son exécution, l'intervalle

(a) Le
implan
échanc
avon

L'amas en est quelque fois assez considerable pour former une tumeur volumineuse, qui fait
 grosse contre celle qui renferme les véritables caux et empêcher que le fœtus puisse
 se présenter au détroit supérieur. Sur la fin de la grossesse comme j'ay eu l'occasion
 de l'observer sur une dame que j'avois déjà touchée plusieurs fois, qui voulant
 s'asseoir une après midy dans un fauteuil, se trouva incontinent inondée par une
 quantité d'eau assez considerable, qu'elle perdit tout à coup: ce qui la mit
 dans le cas de croire qu'elle étoit au moment d'accoucher; à mon arrivée je
 reconnus que ce n'étoient que des fausses caux qui venoient de partir, sans qu'après
 ce la l'enfant eut pris une position convenable; les vaisseaux lymphatiques de
 la matrice, qui n'auroient plus d'union avec le chorion, laisserent transuder
 pendant sept jours la liqueur qu'ils auroient dû transmettre à l'amnios, dans
 une quantité proportionnée aux orifices de ces vaisseaux décolés, avant que
 la dame entra en travail: alors même la tête du fœtus ne se présentant pas
 convenablement au dessus du détroit supérieur, et cette position ne pouvant
 être rectifiée, je fus forcé à la fin de terminer l'accouchement en tirant l'enfant
 par les pieds.

Troisième observation anatomique

qui démontre encore mieux que je ne l'ai fait précédemment, l'existence
 des vaisseaux lacteux ou lymphatiques de la matrice, de même que celle
 des appendices caecales.

10. Il y a huit ans, qu'à la fin de novembre, je fus mandé vers les cinq heures du
 soir, pour aller au secours d'une pauvre femme qui avoit une hemorrhagie
 abondante, et la sage femme qui l'assistoit étoit une aventurière effrontée
 qui n'alloit pour avoir de l'argent à l'hôtel Dieu de Paris, et qui se vantoit
 de n'être jamais dans la nécessité de recourir à personne et d'être opposée
 plusieurs fois à ce que l'on vint me chercher plutôt: en arrivant je trouvai la
 femme morte dans la même attitude où elle avoit été mise pendant le travail.
 Je touchai l'orifice de la matrice qui étoit rempli par les membranes et les caux qui
 le tenoient entre ouvert de la largeur d'un double œuf de six livres.

Je me procurai un rasoir pour faire l'opération sans perdre de temps, j'en retirai
 l'enfant aussi renfermé dans des caux, l'océput placé vers la cavité cotyloïde droite.
 Je coupai le cordon, l'enfant ne donna aucun signe de vie, j'enlevai ensuite la
 matrice du cadavre, et la fis porter chez moi pour en faire l'examen le lendemain
 après midy: le placenta étoit adhérent contre la face interne gauche et inférieure
 de la matrice (a) de manière que le bord inférieur de son disque ne trouvoit
 à peine de niveau avec celui de l'orifice du même côté sans la déborder
 aucunement: il étoit décollé en cet endroit de la profondeur d'un pouce et demi
 au plus, sans que j'y eusse apperçu aucune appendice utérine ni vaisseaux lymphati-
 ques, ils n'étoient sans doute contractés et retirés dans la matrice; quelle fut donc
 ma surprise, en remarquant qu'une hemorrhagie aussi promptement mortelle, ait pu
 être la suite d'un décollement de si peu d'étendue, tandis que jusque là je
 m'étois imaginé, et dans toute que beaucoup d'autres le pensent encore aujourd'hui

(a) Le cordon ombilical
 implanté dans une légère
 échancrure qui se rencontrait
 au bord supérieur.

qu'il n'est pas vraisemblable qu'une femme puisse périr dans l'espace de trois heures — seulement, sans un décollement d'une étendue beaucoup plus considérable que celui qui se presentoit sous mes yeux.

cette observation ne doit elle pas nous mettre en garde contre toute perte un peu violente, quelque courte qu'elle soit la durée de l'opération pour sauver la mère et l'enfant doit en pratiquant à tems l'accouchement forcé, en se conformant aux règles de l'art et aux indications qui peuvent se présenter, doit en arrêtant les pertes de sang par les moyens convenables, aux gens instruits, pour donner le tems à la femme de récupérer ses forces.

20. Comme cette matrice soumise à mon examen étoit moins déchargée de sang que la dernière sur laquelle j'avois fait les remarques précédentes, j'eus la satisfaction dans celle-ci de constater avec évidence que ce que j'avois conjecturé étoit bien réel, surtout à l'égard des faisceaux lymphatiques qui traversoient le placenta; car je m'étois dit plus d'une fois, il est bien réel, comme je n'en puis douter, que de tous les points internes de la matrice où le placenta n'est pas adhérent, il en part une infinité de tuyaux qui se prolongent dans l'épaisseur des membranes pour verser la lymphe dans l'amnios; l'implantation du placenta étant fortuite, il doit pareillement s'y en rencontrer de même nature à cette partie de la matrice, d'où je conclus alors que les longs filets que j'avois aperçus le traverser, étoient aussi des vaisseaux lymphatiques, qui devoient également s'ouvrir dans la partie de l'amnios qui tapisse sa face interne; et c'est ce qui me fut icy parfaitement démontré; car auant de le décoller, j'appressai à cette face interne, un nombre infini de petites encochures, telles qu'on en pratiqueroit de semblables sur du papier, avec la pointe d'une fine épingle; C'est donc par ces orifices que se dégorge également l'humour lymphatique charrié dans les faisceaux qui traversent le placenta, pour être versée dans la cavité de l'amnios, et qui est confirmée par l'observation suivante qui établit encore mieux l'origine des vraies et des fausses eaux renfermées séparément dans la matrice.

Seconde observation Sur les fausses eaux.

30. il y a une quinzaine d'années qu'une femme que j'avois accouché plusieurs fois eut le ventre prodigieusement distendu sur la fin de sa grossesse, en sorte qu'elle passa la dernière quinzaine dans un fauteuil, pouvant à peine faire quelque pas dans son appartement sans être soutenue par deux personnes quoiqu'elle s'appuyât sur ses jambes; enfin le travail se déclara par la perte des eaux, et lors que j'arrivai auprès d'elle, elle en avoit déjà perdu beaucoup: elle se faisoit promener dans la chambre qui étoit spacieuse tantôt d'un endroit à l'autre par ce qu'elle inondoit le plancher sur lequel elle s'étoit arrêtée un moment. Dans l'espace d'une demie heure que je l'observai, je pense qu'elle en rendit bien, avec ce qui s'en étoit déjà écoulé, de quoi remplir cinq pots de nuit; enfin lors qu'elle fut fatiguée, je la touchai pour connoître la position de l'enfant: mais je rencontrai des membranes pleines d'eau, et à travers, une partie que je ne pouvois désigner. Comme les douleurs se faisoient sentir vivement, ces membranes percerent bientôt. l'enfant presentoit la tête, mais il étoit acéphale, et très

19

volumineux, de manière que j'en passai un lac autour du col pour en aider la sortie.

Dans le cas cy, la quantité des fausses eaux qui rendoient le ventre de la mère énorme, ne pouvoit être contenue entre la matrice et le chorion sans que cette membrane n'en ait au moins presque entièrement disparu; et comment concevoir alors, que celles qui venoient de l'air à l'enfant, et qui étoient en quantité ordinaire, luy auroient été transmises autrement que par les voyes que j'ay trouvées établies entre la matrice et le placenta, qui sont démontrées par le grand nombre de porosités, dont il est criblé dans sa face interne; les deux observations touchant les fausses eaux que je viens de citer sont les seules que j'ay eu encore l'occasion de constater dans le courant de ma pratique; et il est tems maintenant de revenir à mon sujet.

4^o je procedai ensuite à la séparation du chorion: je vis que la paroi distendue de la matrice, venoit sur elle même en formant de petits sillons qui imitoient la forme de l'orange, et qui retenoient dans leur interstice, les membranes parsemées de filamens gras, plus fortement adhérentes qu'elles ne paroissent l'être avant la formation de ces replis: que les couloirs lymphatiques qui traversoient ces membranes, étoient remplis d'une lymphe brillante et cristalline, tandis que les filets qui tenoient au chorion, étoient très rouges; qu'il est incontestable, comme l'a annoncé M^r Leuret, que la liqueur de l'amnios est fournie par la matrice même, et non par les vaisseaux du fœtus; que cette liqueur est vraiment lymphatique et par conséquent nutritive, de quelque manière qu'elle luy soit transmise pour son accroissement, mais que cette lymphe n'est point extraite de la matrice par les vaisseaux du chorion, comme il s'étoit imaginé; puis que j'ay reconnu qu'ils ont un usage tout opposé.

5^o je finis mes remarques en achevant la séparation de ce placenta, qui n'étoit commencé naturellement dans une petite portion de son bord inférieur, et dont la perte qui s'en étoit suivie, auroit fait mourir la femme: le bord de ce placenta, comme j'ay déjà annoncé, étoit arrondi dans sa circonférence à l'exception de son bord supérieur qui étoit un peu échancré, et à la quelle échancrure étoit implanté le cordon ombilical: dans ce placenta cy qui n'étoit pas en raquette, les lobes ne s'en développèrent pas si sensiblement qu'au précédent: ils étoient plus étroits, plus affaiblis, et moins étalonnés: les fausses eaux lymphatiques étoient entourés d'un tissu cellulaire plus gras, dont quelques uns se détachèrent de la matrice de la longueur d'un pouce pour adhérer dans la profondeur de ses lobes, tandis que tous les autres abandonnoient le placenta pour rester suspendus à la matrice, qui ne me parut pas plus épaisse en cet endroit, que dans la partie de son étendue, et ou j'en apperceus pas même d'enfoncements propres à recevoir les lobes du placenta qui étoient trop superficiels dans toute pour y faire une impression un peu profonde: et il est bien certain encore que la substance spongieuse de la matrice ny forme point de crêtes pour remplir les enfractuosités du placenta, comme un auteur moderne l'a avancé,



et les parois de cette matrice avoient à peine deux lignes d'épaisseur.

6^e enfin j'ay encore vû que le que m^r astruc appelle appendices veineuses étoient enfoncés dans les cellules du placenta et qu'à mesure que j'eles en retirois, elles paroissoient membraneuses, transparentes, rougeâtres, fluides et élastiques, de la longueur à peu près d'autre trois lignes; qu'elles s'affaïsoient subitement après l'avoir abandonné, de manière que je ne pouvois presque plus les reconnoître du côté de la matrice.

7^o que le placenta est plus adhérent par ses bords, que dans tout le reste de son étendue qui se décolle aussi plus facilement, parce que les extrémités artérielles ombilicales, qui partent de son bord pour se répandre sur la surface extérieure du chorion, pour reporter dans le corps de la mère le superflu du sang du fœtus, qui a besoin d'y être renouvelé, y sont plus grosses et plus nombreuses qu'ailleurs, et forment par le moyen de plus fortes adhérences à la matrice: tandis que la membrane extérieure du placenta qui en recouvre la surface du côté des veines utérines, est très fine, sans qu'on puisse y appercevoir aucun de ces mêmes vaisseaux capillaires sanguins — pénétrer dans la matrice comme le font ceux du chorion.

8^o que la substance de la matrice peut être divisée en trois parties, dont l'extérieure qui la recouvre s'ouvre par le péritoine très mince dans l'état naturel, est devenue cependant d'une épaisseur plus considérable et d'une substance aponeurotique pendant la grossesse, pour en fortifier le tissu, qui dans le moyen seroit bien plus souvent en danger d'être rompu dans les accouchemens laborieux et contre nature: la seconde, composée de mailles d'une nature tendineuse entrelacée de vaisseaux sanguins, forme à peu près les deux tiers de l'épaisseur de la paroi, tandis que la troisième qui est l'intérieure n'étant composée pour ainsi dire que de vaisseaux excrétoires, et de petits canaux propres à admettre les extrémités capillaires du chorion qui vont s'y rendre, est totalement spongieuse et forme le tiers de cette épaisseur qui est aussi molle que la surface extérieure du placenta au quel elle correspond. Souvent on voit le danger que l'on courroit à délivrer une femme de force, soit en tirant trop sur le placenta, soit en voulant le décoller sans précaution avec les doigts, car on peut alors arracher une certaine étendue de cette même substance spongieuse avec les racines des appendices osseales à l'embouchure des veines utérines, qui est fort vasculaire et donner lieu à une perte considérable et souvent funeste: tandis qu'en abandonnant la délivrance à la nature, la contraction de la partie de la matrice où est inséré le placenta se faisant par degrés, ces appendices osseales ont le tems de se dégainer sans violence des cellules du placenta dans les quelles elles étoient plongées.

21

de se contracter insensiblement par l'élasticité de leur membrane et de leur embouchure: joint à ce que les faisceaux lymphatiques qui ont plus de longueur qu'elles, étant dégagés à leur tour de l'épaisseur du placenta qu'elle traversoient en entier, abandonnés ensuite à eux mêmes se rabattent, comme le pourroient faire des auvents, contre les orifices locaux, forment par ce moyen une espèce de filtre qui embarrassant les parties rameuses du sang dans leur interstice, y donnent lieu à la formation de caillots qui peuvent s'étendre jus qu'à l'embouchure des sinus uterins même; tels sont en effet les moyens admirables qu'emploie la nature pour moderer la perte inévitable qui suit la délivrance, et empêcher et souvent les femmes d'y succomber.

90. il est donc de la plus grande importance que les praticiens soient instruits de l'organisation de la matrice telle que je viens de l'exposer: aussi — remarquent-ils quelque fois, que les pertes, quoiqu'elles soient moderées, ensuite d'un accouchement naturel, et qui se continuent au delà de la monte du lait, n'a pas d'autre cause que la faiblesse ou le relâchement des appendices uterins: que celle au contraire qui suit la délivrance précipitée, et qui est accompagnée d'une douleur fixe dans quelque endroit de la matrice avec issue de petits caillots de sang, est une suite du déchirement de quelque un de ces appendices, et d'une partie de la surface interne, très spongieuse de la matrice qui recouvrait l'orifice des sinus uterins. Cet accident accompagné d'une inflammation locale, quoiqu'elle ne s'étende pas, entretient la fièvre, corrompt la qualité du lait, et détermine assez souvent par des aphtes, et un écoulement, qui au bout de quelques semaines, fait périr l'accouchée.

quatrième, et dernière observation anatomique.

Le dernier jour de février 1756: je fus mandé à deux lieues et demie de cette ville, pour une jeune femme, qui touchant au terme de sa grossesse fut surprise tout à coup d'une inflammation érysipélateuse au gosier, accompagnée d'une fièvre violente, assoupissement, délire, pouls conduif &c: je la touchai pour juger de la proximité de son terme: l'orifice étoit relâché de la grandeur d'un petit œuf, sans aucune apparence de travail, et l'on sentoit la tête de l'enfant à travers les membranes.

J'aurois pu accoucher cette femme dans l'espérance de procurer le baptême à son enfant, sans la crainte de hâter la mort de la mère qui étoit à l'extrémité: D'ailleurs je n'étois pas fâché que l'occasion se présentât encore une fois de vérifier les recherches que j'aurois



précédemment faites sur la matrice, j'étois arrivé le soir, et cette femme mourut vers les deux heures du matin. assisté du chirurgien du lieu, je procédai - immédiatement après le dernier soupir, à l'ouverture de la matrice, dont l'épaisseur me parut être à peu près la même qu'aux deux observations précédentes. l'enfant étoit mort. je coupai le cordon ombilical, et je laissai le cadavre dans son lit jusques vers les huit heures du matin, avant de procéder à la vérification des faits précédens.

J'avois l'intention d'en extraire la matrice et de l'emporter avec moy : mais le chirurgien présent, qui se dit être un peu parent de la femme, me témoigna la peine que cela pourroit faire à la famille qui d'ailleurs ny consentiroit pas : je fus donc borné à m'en tenir à la simple inspection des choses telles qu'elles se présentèrent à mes yeux, de manière cependant, à m'affermir tout à fait dans mon sentiment, et me convaincre que si l'existence des mailles utérines, et des vaisseaux lymphatiques dont j'ay parlé, de même que la présence des appendices coeliales de la matrice, n'avoient pûs encore être pleinement démontrés, on ne doit s'imputer qu'à la méthode ordinaire, presque uniquement employée jusques icy, d'examiner la matrice sur le cadavre même, dont les vaisseaux alors toujours volumineux et pleins de sang, se laissent ruisseler à la moindre division que l'on se permet de faire sur cette partie, de manière que les blanches, confonduës avec les rouges, paroissent être toutes de cette dernière couleur : ce qui a trompé les yeux des observateurs, et leur a masqué les phénomènes qui se sont présentés aux miens, en m'y prenant d'une manière toute opposée.

en effet, dans cette circonstance cy, malgré la section longitudinale faite à la partie antérieure de la matrice six heures avant de procéder à son examen; la chaleur encore subsistante du cadavre; le débordement qui a dû s'opérer dans les vaisseaux sanguins; il restoit néanmoins encore trop de sang dans les sinus de la matrice pour ne pas répondre par son écoulement, la confusion dans le discernement que j'é cherchois à faire des appendices coeliales et des faisceaux lymphatiques qui forment les adhérences et les communications établies entre la mère et le fœtus au moyen du placenta : celui cy étoit placé à la partie postérieure de la matrice sous son fond : et par le débordement que j'en fis, je raais qu'une infinité de fillets capillaires dont le plus grand nombre étoit rougeâtres, traverser - comme des fils d'araignée, la distance d'un demi pouce au moins, qui se trouvoit dans la séparation, avant de se rompre, après quoy ils disparurent bientôt en se retirant de part et d'autre, chacun de son côté, mais un grand nombre aussi de ces filamens étoient remplis d'une lymphe

qui leurs donnoit le brillant du cristal: ce qui ne laisse aucun doute sur la nature de ces vaisseaux: tandis qu'une vérosité plus que sanguinolente ruisseloit en même tems par les appendices utérines, inondoit le tout, et augmentoit la confusion dans le discernement des parties.

Jusqu'icy il ne m'est pas venu dans l'idée de vérifier par mes remarques — l'existence des plottons de vaisseaux vermiculaires ou laitteux, tels qu'ils sont décrits dans les planches qu'a fait graver m^r astruc, conjointement avec ce qu'il appelle les appendices loccales ou veineuses de la matrice: j'ignore donc s'il y a effectivement des vésicules lymphatiques ou laitteuses, dont la cavité de chaque vésicule communique dans la matrice par un canal excrétoire qui verse en certain tems le lait ou la lymphe dont la vésicule est remplie: en ce cas il faudroit qu'elles fussent extrêmement petites et multipliées; (ce qui n'est pas vraisemblable, tant par la grosseur, que par le petit nombre de ces vésicules qu'il a fait graver, dans une surface, qui pourroit en comporter un infiniment plus grand nombre) car j'ay remarqué par mes observations, que si l'on veut estimer la somme des tuyaux excrétoires, qui transmettent la lymphe ou l'humour laitteux dans la cavité de la matrice pendant la grossesse, et après l'accouchement: elle ne peut être comparée qu'à celle des petites extrémités artérielles qui s'élevent sur la surface extérieure du chorion, pour en avoir la plus juste estimation? tandis que si l'on vouloit juger de la quantité du sang versé par les appendices utérines dans les racines de la veine ombilicale, on ne pourroit le présumer par la somme de ces mêmes vaisseaux du chorion, dont le petit calibre, malgré leur multiplicité, ne permet pas au sang du fœtus, de retourner à la mère, qu'à une quantité bien moindre à celui même qui est contenu dans des artères ombilicales: telle est donc la manière simple et naturelle par laquelle le sang est porté de la matrice au fœtus, et retourne de celui cy à la mère. et j'en connois point d'autre.



[The page contains extremely faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side. The text is organized into several paragraphs and appears to be written in cursive.]

article quatrieme
 Sur la nature des differens degrés d'adhérence du placenta
 a la matrice.

10: rien de plus commun, lors qu'on procede a la delivrance, avant de donner tout le tems nécessaire a la matrice de revenir sur elle même, d'entendre dire que l'on a trouvé le placenta adhérent, comme si cette adhérence n'étoit pas naturelle, et qu'en conséquence on a été obligé de porter la main dans la matrice pour en operer le détachement, et même quelque fois sans succès, Souvent en est suivie plus d'une fois, la corruption de la partie du placenta resté dans la matrice, accompagnée de l'inflammation de ce viscére, suivie aussi de la mort. tandis que si l'on avoit attendu dans la plus part de ces cas une demie heure, une heure même, le placenta auroit pû être retiré sans grande difficulté; car les tentatives prématurées, mises sans discernement en usage pour précipiter la delivrance, attirent souvent l'irritation sur la matrice qui embrassant plus exactement le corps qu'elle renferme, s'oppose a sa disunion, ce qui étourdit une sage femme au point d'abandonner la partie. Nulle demande ensuite du secours, il n'est pas surprenant que la personne mandée, fasse aussi des tentatives aussi infructueuses, qui augmentant l'état spasmodique de cet organe, y attirent l'inflammation qui rendra l'état de la femme plus dangereux encore qu'il ne l'étoit.

20: j'ay toujours pensé que l'adhérence proprement dite du placenta a la matrice étoit extrêmement rare; car je ne l'ay rencontré qu'une seule fois; et qu'elle ne peut venir que d'un degré de schirrosité plus ou moins marquée dans l'étendue d'un ou de plusieurs lobes du placenta, puisqu'on en a rencontré aussi qui étoient granuleux; et voicy comme je pense qu'elle se forme.

Il est connu de tous les physiologistes que la partie gélatineuse du sang, ou lymphatique, est celle de nos humeurs, qui se durcit par la chaleur, par son épaississement, ou par le ralentissement de la circulation dans les vaisseaux qui la contiennent, ou naissent les obstructions ou concrets, que l'on remarque si souvent dans les autres parties du corps. ors la lymphe utérine qui est transmise au placenta par les vaisseaux lymphatiques dont je viens de prouver plus d'une fois l'existence, ayant acquise par quelque cause que ce soit la dégénération dont je viens de faire mention, les vaisseaux obstrués deviendront par la schirreux dans leur étendue, boucheront en conséquence le placenta a la matrice dont il ne pourra se détacher après l'accouchement que par une espèce de fétidité ou de suppuration lente, si l'obstruction n'est pas totale, ou qui restera un tems indéterminé sans se corrompre, si l'obstruction est totale, comme Bochrave en cite un exemple, au quel je joins aussi



joindre l'observation suivante.

observation d'un placenta squirreux adhérent à
la matrice

Je fus mandé un matin pour procéder à la délivrance de la femme d'un forgeron qui n'avoit put l'être par la sage femme qui nous dit qu'après la sortie de l'enfant qui étoit venu naturellement, elle voulut tirer sur le cordon qui lui resta dans la main, quoy qu'elle n'eut employé aucun effort capable de produire cet effet. Ce qui la détermina à envoyer sur le champ chercher un chirurgien voisin de la malade, pour la délivrer, qui ne pouvant être dirigé par le cordon, tenta de le faire en décollant le placenta par un bord, à quoy il réussit en partie; mais ne pouvant en faire davantage, le sang qui couloit quoy qu'en petite quantité, lui donna de l'inquiétude, sur quoy il me fit prier d'y passer; en examinant l'état des choses, je trouvai le placenta décollé dans une partie de sa circonférence, et voulant parachever le décollement, la matrice irritée par la présence de ma main se contractoit aussitôt vivement, ce qui me mit dans le cas de faire usage de mes deux mains, en les portant alternativement, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre pour tâcher d'en obtenir la séparation; mais toujours même résistance de la part de la matrice, dont je n'ai jamais mieux senti la contraction partielle que dans cette rencontre.

Je pris le parti de temporiser dans l'espérance que la nature seule pourroit en avancer la séparation, puis que les douleurs se renouvelloient d'elles mêmes de tems en tems avec effusion de sang: j'engageai mon confrère à aller faire la visite à l'hôpital dont nous étions fort proche, et que pendant ce tems je n'entreprendrois rien avant son retour qui ne fut qu'après une heure. La perte qui pendant son absence se renouvelloit par intervalle, me donnoit à la fin du souci, et je desirois pouvoir finir: aussitôt après son retour, j'embrassai circulairement toute la circonférence du placenta, avec la main, et que j'avois décollé auparavant, et dont le centre restoit adhérent au fond de la matrice; et je me déterminai à déchirer ainsi circulairement du placenta, tout ce que j'en avois saisi, ce qui se fit successivement, de manière que tout le centre du placenta que nous estimâmes équivaloir au tiers de sa totalité, resta boudé à la matrice.

Je ne me conduisis de cette manière que dans l'intention de diminuer la perte en facilitant la constriction de l'embouchure des Arus utérins qui répondoient à la portion du placenta détaché, dont la présence s'opposoit au resserrement de la matrice propre à produire cet effet.

Je ne fus point trompé dans mon attente; la perte finit totalement, mais j'étois inquiete sur la manière dont s'opérerait la séparation de la portion restante dans la matrice; je m'attendois naturellement

a une fonte putride que j'approchois moins qu'une nouvelle peste qui devoit survenir et dans l'intention de l'accélérer, j'entrepris dans l'après midi une injection emolliente dans la matrice: le procédé causa a la malade une certaine révolution qui détermina bientôt un accès de fièvre assez considérable dont je redoutai d'abord les suites, mais qui heureusement ne dura que vingt quatre heures, au bout desquelles tout rentra dans le calme: je m'abstins par la suite de toute injection et j'attendis la monte du lait, qui se fit aussi contre mon attente. Sans effervescence, la mère presenta le sein a son enfant qui le prit aussitôt, sans qu'elle ait éprouvé pendant la lactation aucun accident, tant de la part des lochies qui furent plus médiocres et de moindre durée que de coutume, que de celle de cette grande partie du placenta qui étoit restée adhérente au fond de la matrice sans avoir subi le moindre degré de corruption; car j'ay fait souvent visite a cette femme pendant le courant de l'allaitement pendant le quel elle ne s'est aperçue d'aucune excretion par la matrice et son enfant n'est toujours bien porté.

je priai cette femme de me faire savoir lors qu'elle seroit dans le cas d'une nouvelle grossesse; mais ayant depuis quitté la ville, pour aller a la campagne dans une forge ou le mari avoit eu occasion de se placer, j'appris quelques années après qu'elle y étoit accouchée, et bien portante, c'est tout ce que j'en ay pu savoir.

article cinquieme

observations sur les fausses germes, ou môles en masse et en grappe, comme il a plu a quelques uns de les nommer, et de la maniere dont les substance sont formées.

Tous les praticiens ont déjà remarqués, que les femmes nouvellement mariées, de même que celles qui approchent de l'âge critique, étoient le plus sujettes a ces fausses couches, ce qui ne peut provenir que d'un défaut d'organisation ou de correspondance convenable, tant de la part des appendices utérins, que de celle des vaisseaux lymphatiques qui s'ouvrent dans la face interne de la matrice, avec le produit de la conception pour en favoriser le développement, a défaut de quoy, l'ouvrage de la nature restera imparfait, comme il arrive dans les môles.

pour en donner l'explication, on peut supposer avec toute vraisemblance que la matrice irritée par la presence de l'esprit véminal, détermine la lymphe qui est en tout tems filtrée par les vaisseaux excretoires que nous avons remarqués dans sa surface interne, a se porter en plus



grande abondance dans la cavité, dont l'orifice interne se trouve exactement fermé soit par contraction spasmodique, soit plus tôt par un gonflement particulier déterminé par l'engorgement des vaisseaux qui entrent dans la substance spongieuse, afin de retenir dans la cavité de ce viscère la quantité de lymphes propre à faciliter par sa présence, l'écartement de ses parois internes, qui se touchoient presque au paravant, et qui dans un pareil état de rapprochement, ne pourroient admettre l'œuf que la trompe doit transmettre dans la cavité, et dont la durée du trajet pour y parvenir ne pût encore être déterminé par les anatomistes, et qui y étant arrivé, il flotte dans cette humeur lymphatique qui le pénètre en le faisant grossir davantage, de manière que bientôt il est en état de contracter des adhérences extérieures contre les parois de la matrice qu'il remplit dans toute l'étendue de sa cavité, et que c'est ainsi que s'opère une bonne conception; tandis que si, avant d'y arriver, ces mêmes parois se trouvent plus écartées qu'ils ne seroient être par une affluence de sérosité plus grande que celle qui a coutume de s'y amasser à cet époque, alors flottant sur les eaux qui le soutiennent, ne pourra toucher la parois de la matrice que par un point de sa surface supérieure, au moyen duquel il lui sera seulement possible d'adhérer; et cette adhérence se forme ordinairement au voisinage de l'embouchure de la trompe de fallope plutôt qu'à l'œuf, ou la rencontre d'une seule appendice utérine et d'un faisceau lymphatique suffisent dans ces commencemens, pour lui fournir l'accroissement qu'il est seulement susceptible de prendre par la suite.

aussi cet œuf mal organisé, ne présente-t-il dans la substance extérieure qu'un paranchyme rempli de caillots de sang, qui y a été déposé par l'appendice veineuse, et n'a pu être repris par les racines ombilicales qui n'ont pu se développer; tandis que le faisceau lymphatique qui la pénètre, le remplit d'une quantité assez considérable de sérosité; d'où il en résulte une masse informe qui prend peu d'accroissement, et du quel la matrice a coutume de se débarrasser dans l'espace ordinaire de six semaines à trois mois au plus.

alors la femme entre en travail accompagné de perte de sang produite dans le cas cy, non par la dissection des appendices veineuses, du placenta dans lequel elles sont implantées dans une vraie grossesse, mais seulement, parce que les sinus aux quels elles correspondent, gorgés de sang plus que de coutume par la suppression, entretiennent pour cette raison une certaine dilatation dans le calibre de ces premières, dont les orifices appuyés contre le corps étranger qui leur faisoit — résistance jusqu'alors, ne leur permettoit pas de se dégorger, jusqu'à

qu'enfin ébranlé par les contractions de la matrice leur point de contact étant détruit, elles le laissent échapper, tant que le faux germe par sa présence entretient la dilatation de la matrice et de ses vaisseaux.

L'hémorragie continue donc autant de temps que l'adhérence du faux germe à la matrice n'est pas rompue, ce qui dépend du degré de consistance du pédicule, et il est à craindre quelquefois que la femme n'y succombe. Si l'art ne vient au secours de la nature, je me contenterai de rapporter les deux exemples suivants.

une dame d'une constitution nerveuse, et d'une complexion mollesse mère de trois enfans déjà grands, devint enceinte d'un faux germe. à deux mois de cette fausse grossesse, elle fut atteinte d'une hémorragie qui la réduisit bientôt à la dernière extrémité. Je fus mandé à son secours; l'orifice externe étoit si peu entrouvert que je n'y pus introduire l'extrémité du doigt, ny sentir le corps étranger: le tampon mit fin heureusement à la perte et autres accidens: les grandes chaleurs qu'il faisoit le jour la m'engagerent au bout d'un certain tems, à renouveler le tampon, pour ruer la mauvaise odeur: alors pouvant introduire le doigt dans l'orifice interne et à côté du faux germe, je l'accrochai et en fis l'extraction: le pédicule qui le retenoit à la matrice, se trouvant éraciné dans la substance du placenta comme par l'effet d'un emporte pièce, jus qu'au niveau de l'annéris, nous considérâmes les cause renfermées, à travers cette petite portion de membrane qui avoit resté dans son intégrité. ce faux germe n'étoit guères plus volumineux qu'un œuf de pigeon.

La seconde observation concerne l'extraction d'un faux germe plus charnu et plus volumineux que le précédent: depuis huit jours la femme robuste qui le portoit, éprouvoit une perte qui n'auoit cependant attiré aucun des accidens rapportés dans la précédente. j'en fis l'extraction avec la pince à faux germe; le pédicule le suivit, il avoit un pouce de longueur, et trois lignes de circonférence: je l'ay conservé quel que tems par curiosité d'autant qu'il étoit le seul que j'eusse encore vu se rompre du côté de la matrice plutôt que d'abandonner la substance du placenta sur la quelle je n'ai jamais trouvé de vestige qui vers le bord supérieur et latéral, par la raison qu'il a contracté adhérence au voisinage de la trompe de fallope.



De la Seconde espèce de faux germe, appelée môle en grappe
ou vésiculaire.

La môle en grappe ou vésiculaire, est infiniment plus rare que les précédentes, puisque des praticiens qui exercent depuis bien des années, n'ont pas eu lieu de l'observer par eux mêmes; et combien la raison ne s'est-elle pas agitée autre fois pour l'explication d'un pareil phénomène; cependant il résulte encore naturellement de la présence des appendices veineux, et des faisceaux lymphatiques de la matrice; mais pour la formation, il exige un concours de circonstances un peu différents que pour le faux germe ordinaire; en effet le volume considérable que l'on rencontre quelque fois à cet égard, fait connaître que son adhérence a beaucoup de surface à la matrice: entre cinq exemples dont j'ai été témoin, je me contenterai, pour finir, de rapporter celui cy.

je fus averti un matin pour me transporter hors de la ville, pour une laitière que l'on disoit grosse, et attaquée d'une grande peste de sang: étant arrivé, on me fit appercevoir sur le seuil de la porte, une masse aplatie, ronde, d'un pied environ de diamètre, remplie de vésicules blanches et noires, mêlées - confusément de la grosseur des plus gros grains de raisins de ce pays, retenues par des pédicules: je ne m'arrêtai pas longtemps à la considérer: il m'en étoit déjà tombé trois sous la main, mais elles n'étoient pas aussi considérables que celle cy.

pour expliquer cette dégénération particulière, il faut que l'œuf ait été adhérent dans son principe à toute la circonférence de la matrice et que le placenta ait été organisé à un certain point, pour que les appendices utérines aient pu en nombre suffisant, verser le sang dans les cellules du placenta, et de là dans les ramifications de la veine ombilicale, qui se sera obstruée par la suite, pour les gonfler au point de produire un grand nombre de vésicules noires, de la grosseur d'une olive; tandis que les faisceaux lymphatiques à leur tour, se trouvant obstrués du côté de la face interne du placenta, se sont gorgés de la lymphe qu'ils devoient transmettre à l'embryon, et produisent dans son paranchyme, ces vésicules blanches, de la même grosseur que les précédentes, qui tiennent ensemble par des pédicules et le tissu cellulaire qui réunit les vaisseaux du placenta.

nédéy

membre sur le développement
et la forme crâne de la matrice

n° 86.